



Flachlandbiotopkartierung Landsberg am Lech

Landkreisfläche (ha): 80448,58

Biotopanteil (%): 3,03

Anzahl Biotope: 1291

Anzahl Teilflächen: 3872

Biotopfläche (ha): 2441,35

Zeitraum der Erfassung: 24.07.1987 **bis** 27.09.2019

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 7731 | 14 | 1144 | 29 |
| 7830 | 42 | 46 | 5 |
| 7831 | 8 | 1058 | 143 |
| 7832 | 10 | 67 | 58 |
| 7930 | 9 | 43 | 35 |
| 7931 | 1 | 1024 | 156 |
| 7932 | 69 | 1077 | 252 |
| 8030 | 1 | 42 | 42 |
| 8031 | 3 | 1087 | 306 |
| 8032 | 76 | 1058 | 188 |
| 8033 | 454 | 454 | 1 |
| 8130 | 172 | 176 | 5 |
| 8131 | 2 | 1210 | 70 |
| 8132 | 343 | 343 | 1 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte | 30,86 | 1,26 |
| Artenreiches Extensivgrünland | 19,07 | 0,78 |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6510 | 106,78 | 4,37 |
| Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT | 5,61 | 0,23 |
| Auwälder | 83,71 | 3,43 |
| Auwälder / 91E0 | 12,89 | 0,53 |
| Borstgrasrasen / kein LRT | 0,11 | 0 |
| Bruchwälder | 7,48 | 0,31 |
| Feldgehölz, naturnah | 41,11 | 1,68 |
| Fels mit Bewuchs, Felsvegetation / 8210 | 0,51 | 0,02 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan | 164,35 | 6,73 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430 | 2,02 | 0,08 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT | 10,72 | 0,44 |
| Feuchtgebüsche | 68,02 | 2,79 |
| Flachmoor, Streuwiese | 213,18 | 8,73 |
| Flachmoore und Quellmoore / 7230 | 8,57 | 0,35 |
| Flachmoore und Quellmoore / kein LRT | 3,28 | 0,13 |
| Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz | 4,5 | 0,18 |
| Gewässer-Begleitgehölze, linear | 69,65 | 2,85 |
| Großröhrichte / 3140 | 7,49 | 0,31 |
| Großröhrichte / 3150 | 12,11 | 0,5 |
| Großröhrichte / 3260 | 0,64 | 0,03 |
| Großröhrichte / kein LRT | 2,8 | 0,11 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Großseggenried | 214,06 | 8,77 |
| Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone | 13,42 | 0,55 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3140 | 1,12 | 0,05 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3150 | 10,12 | 0,41 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3260 | 0,11 | 0 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT | 2,54 | 0,1 |
| Hecken, naturnah | 59,9 | 2,45 |
| Hochmoor / Übergangsmoor | 27,78 | 1,14 |
| Initiale Gebüsche und Gehölze | 18,28 | 0,75 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / 3150 | 0 | 0 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT | 0,12 | 0,01 |
| Initialvegetation, naß | 5,13 | 0,21 |
| Initialvegetation, trocken | 13,81 | 0,57 |
| Kiefernwälder, basenreich | 3,61 | 0,15 |
| Kleinröhrichte / 3140 | 1,73 | 0,07 |
| Kleinröhrichte / 3260 | 0,15 | 0,01 |
| Kleinröhrichte / kein LRT | 0,28 | 0,01 |
| Landröhrichte | 14,39 | 0,59 |
| Laubwälder, bodensauer | 1,35 | 0,06 |
| Laubwälder, mesophil | 82,45 | 3,38 |
| Löß- und Lehmwände | 1,31 | 0,05 |
| Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache | 23,65 | 0,97 |
| Magerrasen, basenreich | 18,98 | 0,78 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Magerrasen, basenreich / 5130 | 0,02 | 0 |
| Magerrasen, basenreich / 6210 | 31,33 | 1,28 |
| Magerrasen, basenreich / 621P | 19,06 | 0,78 |
| Magerrasen, bodensauer | 1,4 | 0,06 |
| Mesophiles Gebüsche, naturnah | 16,31 | 0,67 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260 | 48,32 | 1,98 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT | 38,48 | 1,58 |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 3160 | 0,82 | 0,03 |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7110 | 1,93 | 0,08 |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7120 | 18,38 | 0,75 |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7140 | 8,42 | 0,34 |
| Offene Hoch- und Übergangsmoore / 7150 | 1,22 | 0,05 |
| Parks, Haine, Grünanlagen mit Baumbestand | 1,35 | 0,06 |
| Pfeifengraswiesen / 6410 | 28,04 | 1,15 |
| Pfeifengraswiesen / kein LRT | 4,52 | 0,19 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / 7220 | 3,97 | 0,16 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT | 0,01 | 0 |
| Schneidried-Sümpfe | 1,68 | 0,07 |
| Schuttfluren und Blockhalden / 8160 | 2,49 | 0,1 |
| Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe | 126,07 | 5,16 |
| Sonstige Flächenanteile | 9,71 | 0,4 |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte) | 139,13 | 5,7 |
| Stillgewässer mit Armleuchteralgen ohne §30-Schutz | 0,17 | 0,01 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Torfstich-Regeneration | 1,84 | 0,08 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation | 56,69 | 2,32 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140 | 147,01 | 6,02 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150 | 26,15 | 1,07 |
| Unverbautes Fließgewässer | 40,42 | 1,66 |
| Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern | 0,13 | 0,01 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140 | 104,75 | 4,29 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150 | 8,9 | 0,36 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT | 6,51 | 0,27 |
| Verlandungsröhricht | 90,54 | 3,71 |
| Wald | 0,54 | 0,02 |
| Wärmeliebende Säume | 0,31 | 0,01 |
| Wärmeliebende Säume und Gebüsche | 6,78 | 0,28 |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden | 0,06 | 0 |
| Flächen ohne Biotopzuordnung | 58,15 | 2,38 |