
Fallkonstellationen
1. Nestkontrolle:
Ende APR/MAI
2. Nestkontrolle:
JUN/JUL
Nestersuche Winter
Seeadler, Fischadler, Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke, Wespenbussard, Uhu
(baumbrütende Wanderfalke)
Einfacher Fall
gehölzarme Landschaften, Einzelbäume, Baumgruppen (< 5 %), Strommasten
und
ebene bis leicht konturierte Landschaft
2 min / ha Gehölze
Mittelschwerer Fall
mehrere Gehölzgruppen, Galeriewald, Waldanteil bis 30 %
Laubwald mit geringem Nadelholzanteil
und / oder
Hügelland mit mittlerer Reliefenergie
4 min / ha Gehölze
Komplexer Fall
Laub-, Kiefern- oder Mischwaldanteil 31-60 %, Fichtenanteil bis 30 Prozent,
und / oder
hohe Reliefenergie, steile Täler
6 min / ha Gehölze
Nadelwald dominant
Großflächiger Nadelwald
Begang der inneren (Lichtungen, Schlag-flächen) und äußeren Randlinien bis 50 m
10 min / ha Randlinienbereich
Uhu Brutplatzsuche
Verhören, Klangattrappe, Horchbox
min. 1,5 h, max. 4,5 h
Kein Besatz festgestellt
Fischadler, Rot-, Schwarzmilan Wanderfalke*
1 min / ha
Kein Besatz festgestellt
Fischadler, Rot-, Schwarzmilan Wanderfalke*
2 min / ha
Kein Besatz festgestellt
Fischadler, Rot-, Schwarzmilan Wanderfalke*
3 min / ha
Kein Besatz festgestellt
Fischadler, Rot-, Schwarzmilan Wanderfalke*
2 min / ha
Besatzkontrolle, Zweitbesetzung
Spätbrüter Baumfalke und Wespenbussard
1 min / ha
Besatzkontrolle, Zweitbesetzung
Spätbrüter Baumfalke und Wespenbussard
2 min / ha
Besatzkontrolle, Zweitbesetzung
Spätbrüter Baumfalke und Wespenbussard
3 min / ha
Besatzkontrolle, Zweitbesetzung
Spätbrüter Baumfalke und Wespenbussard
2 min / ha
Brutplatzerfassung
* Bereits im Februar