



Flachlandbiotopkartierung Aichach-Friedberg

Landkreisfläche (ha): 78033,57

Biotopanteil (%): 1,61

Anzahl Biotope: 1526

Anzahl Teilflächen: 2790

Biotopfläche (ha): 1258,82

Zeitraum der Erfassung: 10.07.1985 **bis** 16.07.2017

Alle Angaben beziehen sich auf das jeweilige Erhebungsdatum. Einzelne Änderungen wurden im Zeitraum berücksichtigt. Die Biotopnummernangaben können Lücken (z.B. Anteile anderer Landkreise) aufweisen.

| TK25 | von Biotop Nr. | bis Biotop Nr. | Anzahl |
|------|----------------|----------------|--------|
| 7332 | 85 | 1010 | 18 |
| 7431 | 67 | 1123 | 102 |
| 7432 | 2 | 1185 | 256 |
| 7433 | 88 | 1136 | 46 |
| 7531 | 20 | 1099 | 126 |
| 7532 | 1 | 1218 | 260 |
| 7533 | 70 | 1120 | 118 |
| 7631 | 3 | 1055 | 77 |
| 7632 | 7 | 1196 | 254 |
| 7633 | 149 | 1181 | 12 |
| 7731 | 34 | 1133 | 123 |
| 7732 | 1 | 1118 | 134 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte | 5,97 | 0,47 |
| Artenreiches Extensivgrünland | 5,69 | 0,45 |
| Artenreiches Extensivgrünland / 6510 | 33,68 | 2,68 |
| Artenreiches Extensivgrünland / kein LRT | 7,18 | 0,57 |
| Auwälder | 165,81 | 13,17 |
| Auwälder / 91E0 | 32,77 | 2,6 |
| Bruchwälder | 1,97 | 0,16 |
| Feldgehölz, naturnah | 98,49 | 7,82 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan | 15,65 | 1,24 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 6430 | 3,12 | 0,25 |
| Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / kein LRT | 3,45 | 0,27 |
| Feuchtgebüsche | 3,27 | 0,26 |
| Flachmoore und Quellmoore | 2,95 | 0,23 |
| Flachmoore und Quellmoore / 7230 | 0,12 | 0,01 |
| Flachmoore und Quellmoore / kein LRT | 0,37 | 0,03 |
| Fließgewässer | 0,25 | 0,02 |
| Fließgewässer mit flutender Wasservegetation ohne §30-Schutz | 11,95 | 0,95 |
| Gewässer-Begleitgehölze, linear | 29,5 | 2,34 |
| Großröhrichte | 19,71 | 1,57 |
| Großröhrichte / 3150 | 1,36 | 0,11 |
| Großröhrichte / kein LRT | 7,42 | 0,59 |
| Großseggenried | 2,25 | 0,18 |
| Großseggenriede außerhalb der Verlandungszone | 44,43 | 3,53 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Großseggenriede der Verlandungszone / 3150 | 0,15 | 0,01 |
| Großseggenriede der Verlandungszone / kein LRT | 1,27 | 0,1 |
| Großseggenrieder der Verlandungszone | 3,01 | 0,24 |
| Hecken, naturnah | 103,31 | 8,21 |
| Initiale Gebüsche und Gehölze | 25 | 1,99 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich | 3,45 | 0,27 |
| Initialvegetation, kleinbinsenreich / kein LRT | 0,34 | 0,03 |
| Initialvegetation, naß | 1,86 | 0,15 |
| Initialvegetation, trocken | 3,87 | 0,31 |
| Kleinröhrichte | 1,48 | 0,12 |
| Kleinröhrichte / 3150 | 0,03 | 0 |
| Kleinröhrichte / kein LRT | 0,83 | 0,07 |
| Landröhrichte | 84,46 | 6,71 |
| Laubwälder, bodensauer | 6,81 | 0,54 |
| Laubwälder, mesophil | 119,37 | 9,48 |
| Magere Altgrasbestände und Grünlandbrache | 18,46 | 1,47 |
| Magerrasen, basenreich | 6,96 | 0,55 |
| Magerrasen, basenreich / 6210 | 16,59 | 1,32 |
| Magerrasen, basenreich / 621P | 6,01 | 0,48 |
| Magerrasen, bodensauer | 0,32 | 0,03 |
| Mesophiles Gebüsche, naturnah | 4,99 | 0,4 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer | 1,58 | 0,13 |
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / 3260 | 10,58 | 0,84 |

| Biotoptyp | Flaeche (ha) | Anteil (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Natürliche und naturnahe Fließgewässer / kein LRT | 15,72 | 1,25 |
| Nitrophytische Hochstaudenflur | 0,26 | 0,02 |
| Pfeifengraswiesen | 4,59 | 0,36 |
| Pfeifengraswiesen / 6410 | 11 | 0,87 |
| Pfeifengraswiesen / kein LRT | 1,94 | 0,15 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah | 0,02 | 0 |
| Quellen und Quellfluren, naturnah / kein LRT | 0,05 | 0 |
| Rohboden | 1,38 | 0,11 |
| Ruderalflur | 1,55 | 0,12 |
| Sandmagerrasen | 2,72 | 0,22 |
| Sandmagerrasen / Kein LRT | 0,06 | 0 |
| Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Sümpfe | 177,66 | 14,11 |
| Sonstige Flächenanteile | 22,41 | 1,78 |
| Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte) | 47,13 | 3,74 |
| Streuobstbestand | 0,11 | 0,01 |
| Sumpfwälder | 3,29 | 0,26 |
| Sumpfwälder / Kein LRT | 0 | 0 |
| Ufergehölz naturnaher Fließgewässer | 0,23 | 0,02 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation | 5,58 | 0,44 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3140 | 0,06 | 0 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / 3150 | 1,34 | 0,11 |
| Unterwasser- und Schwimmblattvegetation / kein LRT | 0,26 | 0,02 |
| Unverbautes Fließgewässer | 0,01 | 0 |

| Biototyp | Fläche (ha) | Anteil (%) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Vegetationsfreie Wasserfläche in nicht geschützten Gewässern | 21,5 | 1,71 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern | 2,65 | 0,21 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3140 | 0,02 | 0 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern / 3150 | 3,26 | 0,26 |
| Vegetationsfreie Wasserflächen in geschützten Stillgewässern /kein LRT | 1,99 | 0,16 |
| Verlandungsröhricht | 2,46 | 0,2 |
| Verlandungsvegetation an nicht geschützten Stillgewässern | 1,59 | 0,13 |
| Wärmeliebende Gebüsche | 0,42 | 0,03 |
| Wärmeliebende Gebüsche / kein LRT | 0,56 | 0,04 |
| Wärmeliebende Säume | 0,78 | 0,06 |
| Zwergstrauch- und Ginsterheiden | 0,07 | 0,01 |
| Flächen ohne Biotopzuordnung | 8,05 | 0,64 |