# NATURA 2000, Gebietsrecherche online

## Gebietsdaten NATURA 2000

| | |
|---|---|
| **Gebiets-Nr.** | **8134-371** |
| **Gebietsname** | **Moore südlich Königsdorf, Rothenrainer Moore und Königsdorfer Alm** |
| Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
| Größe (ha) | 1.071,6 |
| Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
| Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
| Naturschutzfachliche Bedeutung | Zusammen mit Loisachmooren Moorzentrum des mittleren bayerischen Alpenvorlandes, größtes Buckelwiesengebiet des nödlichen Alpenvorlandes mit Magerrasen-Restvorkommen. |

Liste der Managementpläne

## Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Bezeichnung | prioritär |
|---|---|---|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
| 6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
| 6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
| 6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
| 7110 | Lebende Hochmoore | ja |
| 7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
| 7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
| 91D0 | Moorwälder | ja |

## Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie

| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
|---|---|---|
| Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
| Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
| Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | |
| Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | |
| Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
| Triturus cristatus | Kammmolch | |

## Landkreise

| Landkreis | Flächenanteil in % | |
|---|---|---|

## Betroffene TK 25

| Nummer | Haupt-TK | |
|---|---|---|
| 8134 | ja | |
| 8135 | | |
| 8234 | | |
| 8235 | | |

Stand: 2016

Verantwortlich für Inhalt und Umsetzung ist das Bayerische Landesamt für Umwelt (http://www.lfu.bayern.de/impressum)