



Ophiogomphus cecilia

Foto: R. Büttner

Glaucopsyche nausithous

Foto: B. Reiser

Bestandsdichten der Exuvien der Grünen Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

- Geringe Exuviendichte
- Mittlere Exuviendichte
- Hohe Exuviendichte

Bestandsdichten der Imagines der Grünen Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)

- Geringe Individuendichte
- Mittlere Individuendichte
- Hohe Individuendichte

Weitere Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie

- Bereich mit Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Glaucopsyche nausithous*)
- Laichgewässer der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*)
- ⊕ Verlust eines Biotops der Gelbbauchunke
- Bereich mit Vorkommen der Kleinen Flussmuschel (*Unio crassus*)
- * Vorkommen von *Ramalina fraxinea*

0 250 500 Meter



MANAGEMENTPLAN FÜR DAS FFH-GEBIET 6630-301 "BIBERT UND HASELBACH"

Im Auftrag der Regierung von Mittelfranken

Maßstab 1: 10.000
Datum Nov. 2003, Umarbeitung auf M 1:10.000 Sept. 2006
Grundlage: Flurkarten und Luftbilder NW05927, NW05928, NW06025, NW06026, NW06027, NW06125, NW06127, NW06128
 Einfügen der FFH-Feinabgrenzung Januar 2008



Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft
 Am Wasserschloß 28b
 91126 Schwabach
 Tel.: +49 911 / 637842
 Fax: +49 911 / 636679
 IVL-Bayern
 Georg-Eger-Straße 1b
 91334 Hemhofen
 Tel.: +49 9195 / 9497 0
 Fax: +49 9195 / 9497 10
 IVL.Germany@ivl-web.de

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie