

SPA-Gebietsgrenze

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemäß SDB

Revierzentren Brutvögel:	EHZ	Anh I / Art 4(2)	Revierzentren Brutvögel:	EHZ	Anh I / Art 4(2)
Be	Bekassine	C Art 4	Nr	Nachtreier (U) (Z)	C Anh I
Bk	Blauehlichen	A Anh I	Nt	Neuntöter	C Anh I
Bk	Braunehlichen	C Art 4	Pr	Pururreiher (U)	C Anh I
Dg	Dorngrasmücke	B Art 4	Rw	Rohrweihe	B Anh I
Drs	Drosselrohrsänger	C Art 4	Ros	Rotschenkel	C Art 4
Ev	Eisvogel	C Anh I	Sr	Schilfrohrsänger	C Art 4
Ga	Grauerammer	C Art 4	Sn	Schnatterente	B Art 4
Grr	Graureiher	B Art 4	Skm	Schwarzkopfmöwe	C Anh I
Gbv	Großer Brachvogel	C Art 4	Swm	Schwarzmilan (G)	C Anh I
Ht	Haubentaucher	C Art 4	Ta	Tafelente	C Art 4
Ki	Kiebitz	C Art 4	Us	Uferschnepfe	C Art 4
Kn	Knäkente	B Art 4	W	Wiesenschnepfe	B Art 4
Kw	Kornweihe (Schafplatz)	B Anh I	St	Wiesenschafstelze	B Art 4
Kr	Krickente	C Art 4	Wa	Wachtel	B Art 4
Lm	Lachmöwe	C Art 4	Wk	Wachtelkönig	C Anh I
Lö	Löffelente	C Art 4	Wst	Weißstorch	A Anh I

Erhaltungszustand
 A hervorragend
 B gut
 C mittel bis schlecht

Brutstatus
 A Ausnahmestage
 B Brutvogel (vergleiche Brutstatus)
 G (Nahrungs-) gast
 N Nahrungsgast

Status im Gebiet
 U Übersommerer
 W Wintergast
 Z Zugvogel
 BP = Brutpaare

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind

Revierzentren Brutvögel:	Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora gem. SDB, 3.3
Bp	Baumpieper
Bem	Beutelmeise
Bf	Baumfalke
Fs	Feldschwirl
Frp	Flussregenpfeifer
Ku	Kuckuck
P	Pirol
Rm	Rotmilan (N)
Su	Sumpfrohrsänger
T	Teichrohrsänger
Waw	Waldwasserläufer (Z) (W) (U)
Ww	Wasserralle
D	Döhle (Schafplatz)
Zd	Zwergdommel (Z)
Zt	Zwergtaucher


Sonstige charakteristische Brutvögel, die unter 3.3 des SDB ergänzt werden sollten

Gr	Graugans
Ra	Rohrammer
Sm	Schwanzmeise
Tr	Teichhuhn
Wm	Weidenmeise

Weitere Zugvögel mit signifikanten Vorkommen im SPA

D	Döhle (Schafplatz)
F	Fitis (B)
M	Mittelmeermöwe (B)

- Habitats der Vogelarten (SDB)**
- SPA-Gebiet (Mertin (W), Schwarzmilan (G), Silberreiher (W) (Z) (U), Singenschwan (Z), Stockente)
 - SPA-Gebiet ohne Altmühle (Kornweihe (W), Wachtel, Weißstorch, Wiesenschafstelze)
 - Gastvögel im SPA-Gebiet an Flachmulden und Hochwasserseigen (Bekassine, Bruchwasserläufer (Z), Grünschenkel (Z), Kampfläufer (Z), Knäkente (Z), Löffelente, Pfeifente, Rotschenkel (Z), Spießente)
 - Wiesener-Habitat, herausragende, bundesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Grauerammer, Großer Brachvogel, Kampfläufer (hier Brut habitat), Rotschenkel, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenschnepfe, Seeadler]
 - Wiesener-Habitat, sehr hochwertig, landesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Goldregenpfeifer (Z), Grauerammer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenschnepfe]; nur im Wiesmet: [Knäkente, Löffelente, Kampfläufer (Z)]
 - Wiesener-Habitat, hochwertig, überregionale Bedeutung [Grauerammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenschnepfe]
 - Wiesener-Habitat [Kiebitz]
 - Röhricht-Habitats auf der Vogelinsel [Blauehlichen, Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Pururreiher, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle]
 - Röhricht, Großseggen oder Hochstauden mit einzelnen Gehölzen im SPA-Gebiet außerhalb der Vogelinsel [Blauehlichen, Dorngrasmücke, Rohrweihe, Schilfrohrsänger]
 - Fließgewässerhabitat [Eisvogel]
 - Vogelinsel mit Komplex aus Röhrichten, Inseln und Weichholzbeständen [Stelzenläufer (A), Bekassine, Brandgans, Brandseeschwalbe (A), Bruchwasserläufer, Fischadler, Goldregenpfeifer, Grauerammer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Haubentaucher, Kampfläufer, Knäkente, Kranich (Z), Krickente, Küstenseeschwalbe (A), Lachmöwe, Löffelente, Löffler (Z) (U), Moorente, Nachtreier, Odinshühchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe (Z), Rotschenkel, Säbelschnäbler, Schnatterente, Schwarzkopfmöwe, Seidenreiher, Spießente, Sumpfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Gehölz-Ringwall auf der Vogelinsel [Beutelmeise, Fischadler, Nachtreier, Schwarzmilan, Seeadler]
 - Seefläche [Brandseeschwalbe (A), Fischadler, Haubentaucher, Küstenseeschwalbe (A), Odinshühchen (A), Ohrentaucher, Prachtaucher, Raubseeschwalbe, Spießente, Trauerseeschwalbe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Seeadler-Nahrungshabitat mit Ruhezonen
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze, feuchte Ausbildung [Braunehlichen, Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze [Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Waldchen und Feldgehölze [Baumfalke, Seeadler, Schwarzmilan]



Managementplanung
SPA-Gebiet 6728-471
Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlensee

Karte 2 Bestand und Bewertung der Habitats der Vögel

Blatt: 6 von 9 Kartenfertigung: 27.08.2014

Bearbeitung:
 Planungsbüro: Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie

Regierung von Mittelfranken

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 500 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)