



SPA-Gebietsgrenze

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemäß SDB

Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)	Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)
Be	Bekassine	C Art 4	Nr	Nachtreier (U) (Z)	C Anh I
Bk	Blauehlichen	A Anh I	Nt	Neuntöter	C Anh I
Bg	Braunehlichen	C Art 4	Pr	Pururreiher (U)	C Anh I
Dg	Dorngrasmücke	B Art 4	Row	Rohrweihe	B Anh I
Dr	Drosselrohrsänger	C Art 4	Ros	Rotschenkel	C Art 4
Ev	Eisvogel	C Anh I	Sr	Schilfrohrsänger	C Art 4
Ga	Grauerammer	C Art 4	Sn	Schnatterente	B Art 4
Grr	Graureiher	B Art 4	Skm	Schwarzkopfmöwe	C Anh I
Gbv	Großer Brachvogel	C Art 4	Swm	Schwarzmilan (G)	C Anh I
Ht	Haubentaucher	C Art 4	Ta	Tafelente	C Art 4
Ki	Kiebitz	C Art 4	Us	Uferschnepfe	C Art 4
Kn	Knäkente	B Art 4	W	Wiesenpieper	B Art 4
Kw	Kornweihe (Schafplatz)	B Anh I	Wt	Wiesenschafstelze	B Art 4
Kr	Krickente	C Art 4	Wk	Wachtelkönig	B Art 4
Lm	Lachmöwe	C Art 4	Wk	Wachtelkönig	C Anh I
Ld	Löffelente	C Art 4	Wst	Weißstorch	A Anh I

Erhaltungszustand
A hervorragend
B gut
C mittel bis schlecht

Brutstatus
 A Ausnahmestadium
 B Brutvogel (vergleiche Brutstatus)
 C Brutnachwuchs
 BP = Brutpaare

Status im Gebiet
 U Übersommerer
 W Wintergast
 Z Zuggast
 N Nahrungsgast

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind

Revierzentren Brutvögel:

- Bp Baumpieper
- Bem Beutelmiese
- Bf Baumfalke
- Fs Feldschwirl
- Frp Flussregenpfeifer
- Ku Kuckuck
- P Pirol
- Rm Rotmilan (N)
- Su Sumpfrohrsänger
- T Teichrohrsänger
- Waw Waldwasserläufer (Z) (W) (U)
- Ww Wasserralle
- Ww Wiesenweihe (N) (Z)
- Zd Zwergdommel (Z)
- Zt Zwergtaucher

Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora gem. SDB, 3.3
 Ko Kormoran (B)

Sonstige charakteristische Brutvögel, die unter 3.3 des SDB ergänzt werden sollten

- Gra Graugans
- Ro Rohrammer
- Sm Schwanzmeise
- Tr Teichhuhn
- Wm Weidenmeise

Weitere Zugvögel mit signifikanten Vorkommen im SPA

- D Dohle (Schafplatz)
- F Fitis (B)
- Mmm Mittelmeermöwe (B)

- Habitats der Vogelarten (SDB)**
- SPA-Gebiet (Merlin (W), Schwarzmilan (G), Silberreiher (W) (Z) (U), Singschwan (Z), Stockente)
 - SPA-Gebiet ohne Altmühle (Kornweihe (W), Wachtel, Weißstorch, Wiesenschafstelze)
 - Gastvögel im SPA-Gebiet an Flachmulden und Hochwasserseigen (Bekassine, Bruchwasserläufer (Z), Grünschenkel (Z), Kampfläufer (Z), Knäkente (Z), Löffelente, Pfeifente, Rotschenkel (Z), Spießente)
 - Wiesenbrüter-Habitat, herausragende, bundesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Grauerammer, Großer Brachvogel, Kampfläufer (hier Brut habitat), Rotschenkel, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Seeadler]
 - Wiesenbrüter-Habitat, sehr hochwertig, landesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Goldregenpfeifer (Z), Grauerammer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Sumpfrohrsänger (W) (Z), Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper]; nur im Wiesent; [Knäkente, Löffelente, Kampfläufer (Z)]
 - Wiesenbrüter-Habitat, hochwertig, überregionale Bedeutung [Grauerammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper]
 - Wiesenbrüter-Habitat [Kiebitz]
 - Röhricht-Habitats auf der Vogelnest [Blauehlichen, Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Pururreiher, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle]
 - Röhricht, Großseggen oder Hochstauden mit einzelnen Gehölzen im SPA-Gebiet außerhalb der Vogelnest [Blauehlichen, Dorngrasmücke, Rohrweihe, Schilfrohrsänger]
 - Fließgewässerhabitat [Eisvogel]
 - Vogelnest mit Komplex aus Röhrichten, Inseln und Weichholzbeständen [Stelzenläufer (A), Bekassine, Brandgans, Brandseeschwalbe (A), Bruchwasserläufer, Fischadler, Goldregenpfeifer, Grauerammer, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Haubentaucher, Kampfläufer, Knäkente, Kranich (Z), Krickente, Küstenseeschwalbe (A), Lachmöwe, Löffelente, Löffler (Z) (U), Moorente, Nachtreier, Odinshühchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe (Z), Rotschenkel, Säbelschnäbler, Schnatterente, Schwarzkopfmöwe, Seidenreiher, Spießente, Sumpfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Gehölz-Ringwall auf der Vogelnest [Beutelmiese, Fischadler, Nachtreier, Schwarzmilan, Seeadler]
 - Seefläche [Brandseeschwalbe (A), Fischadler, Haubentaucher, Küstenseeschwalbe (A), Odinshühchen (A), Ohrentaucher, Prachtaucher, Raubseeschwalbe, Spießente, Trauerseeschwalbe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
 - Seeadler-Nahrungshabitat mit Ruhezeiten
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze, feuchte Ausbildung [Braunehlichen, Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Halboffenland-Komplex und Gehölze [Dorngrasmücke, Neuntöter]
 - Waldchen und Feldgehölze [Baumfalke, Seeadler, Schwarzmilan]



Managementplanung
SPA-Gebiet 6728-471
Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee

Karte 2 Bestand und Bewertung der Habitats der Vögel

Blatt: 9 von 9
Kartenfertigung: 27.08.2014

Bearbeitung:
 Planungsbüro: Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie

Regierung von Mittelfranken

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 500 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)