



SPA-Gebietsgrenze

**Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemäß SDB**


Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)	Revierzentren Brutvögel:	EZH	Anh I / Art 4(2)
Be	C	Art 4	Nr	C	Anh I
Bk	A	Anh I	Nt	C	Anh I
Bg	C	Art 4	Pr	C	Anh I
Dg	B	Art 4	Row	B	Anh I
Drs	C	Art 4	Ros	C	Art 4
Ev	C	Anh I	Sr	C	Art 4
Ga	C	Art 4	Sn	C	Art 4
Grr	B	Art 4	Skm	C	Anh I
Gbv	C	Art 4	Swm	C	Anh I
Ht	C	Art 4	Ta	C	Art 4
Ki	C	Art 4	Us	C	Art 4
Kn	B	Art 4	W	C	Art 4
Kw	B	Anh I	Wt	B	Art 4
Kr	C	Art 4	Wk	C	Anh I
Lm	C	Art 4	Wl	C	Anh I
Lö	C	Art 4	Wst	A	Anh I

Erhaltungszustand	Brutstatus	Status im Gebiet
A hervorragend	mojl (brutvogel / Brutzeitfeststellung)	A Ausnahmestage
B gut	Brutnachweis	B Brutvogel (vergleiche Brutstatus)
C mittel bis schlecht	BP = Brutpaare	C Anhang I
		D Dohle (Schalplatz)
		G (Nahrungs-)gast
		N Nahrungsgast
		Ü Überwinterer
		W Wintergast
		Z Zuggast

- Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind**
- Revierzentren Brutvögel:
- Bp Baumpieper
  - Bem Beutelmeise
  - Bf Baumfalke
  - Fs Feldschwirl
  - Frp Flussregenpfeifer
  - Ku Kuckuck
  - P Pirol
  - Rm Rotmilan (N)
  - Su Sumpfrohrsänger
  - T Teichrohrsänger
  - Waw Waldwasserläufer (Z)(W)(Ü)
  - Ww Wasserralle (N)(Z)
  - Zd Zwergdommel (Z)
  - Zt Zwerghäher
- Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora gem. SDB, 3.3**
- Ko Kormoran (B)
- Sonstige charakteristische Brutvögel, die unter 3.3 des SDB ergänzt werden sollten**
- Gra Graugans
  - Ro Rohrammer
  - Sm Schwanzmeise
  - Tr Teichhuhn
  - Wm Weidenmeise
- Weitere Zugvögel mit signifikanten Vorkommen im SPA**
- D Dohle (Schalplatz)
  - F Fitis (B)
  - Mm Mittelmeermöwe (B)

- Habitats der Vogelarten (SDB)**
- SPA-Gebiet (Mertin (W), Schwarzmilan (G), Silberreiher (W)(Z)(Ü), Singeschwan (Z), Stockente)
  - SPA-Gebiet ohne Altmühle (Kornweihe (W), Wachtel, Weißstorch, Wiesenschafstelze)
  - Gastvögel im SPA-Gebiet an Flachmulden und Hochwasserseigen (Bekassine, Bruchwasserläufer (Z), Grünschenkel (Z), Kampfläufer (Z), Knäkente (Z), Löffelente, Pfeifente, Rotschenkel (Z), Spießente)
  - Wiesenbrüter-Habitat, herausragende, bundesweite Bedeutung [Bekassine, Braunkehlchen, Graumammer, Großer Brachvogel, Kampfläufer (hier Bruthabitat), Rotschenkel, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Seeadler]
  - Wiesenbrüter-Habitat, sehr hochwertig, landesweite Bedeutung [Bekassine, Braunkehlchen, Goldregenpfeifer (Z), Graumammer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Sumpfrohrsänger (W)(Z), Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper]; nur im Wiesmet: [Knäkente, Löffelente, Kampfläufer (Z)]
  - Wiesenbrüter-Habitat, hochwertig, überregionale Bedeutung [Graumammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper]
  - Wiesenbrüter-Habitat [Kiebitz]
  - Röhricht-Habitats auf der Vogelinsel [Blauehlchen, Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Purpurreiher, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle]
  - Röhricht, Großseggen oder Hochstauden mit einzelnen Gehölzen im SPA-Gebiet außerhalb der Vogelinsel [Blauehlchen, Drosselrohrsänger, Rohrweihe, Schilfrohrsänger]
  - Fließgewässerhabitat [Eisvogel]
  - Vogelinsel mit Komplex aus Röhricht, Inseln und Weichholzbeständen [Stelzenläufer (A), Bekassine, Brandgans, Brandseeschwalbe (A), Bruchwasserläufer, Fischadler, Goldregenpfeifer, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Haubentaucher, Kampfläufer, Knäkente, Kranich (Z), Krickente, Küstenseeschwalbe (A), Lachmöwe, Löffelente, Löffler (Z)(Ü), Moorente, Nachtreiher, Orlaufhuhn, Pfeifente, Raubseeschwalbe (Z), Rotschenkel, Säbelschnäbler, Schnatterente, Schwarzkopfmöwe, Seidenreiher, Spießente, Sumpfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
  - Gehölz-Ringwall auf der Vogelinsel [Beutelmeise, Fischadler, Nachtreiher, Schwarzmilan, Seeadler]
  - Seefläche [Brandseeschwalbe (A), Fischadler, Haubentaucher, Küstenseeschwalbe (A), Orlaufhuhn (A), Ohrentaucher, Prachtaucher, Raubseeschwalbe, Spießente, Trauerseeschwalbe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
  - Seeadler-Nahrungshabitat mit Ruhezeiten
  - Halboffenland-Komplex und Gehölze, feuchte Ausbildung [Braunkehlchen, Drosselrohrsänger, Neuntöter]
  - Halboffenland-Komplex und Gehölze [Drosselrohrsänger, Neuntöter]
  - Waldchen und Feldgehölze [Baumfalke, Seeadler, Schwarzmilan]



**Managementplanung**  
**SPA-Gebiet 6728-471**  
**Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee**

**Karte 2 Bestand und Bewertung der Habitats der Vögel**

Blatt: Detailblatt Vogelinsel  
 Kartenfertigung: 27.08.2014

**Bearbeitung:**  
 Planungsbüro: Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie

Regierung von Mittelfranken

Originalmaßstab: 1:2.500  
 Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)  
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)