

SPA-Gebietsgrenze

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemäß SDB

Revierzentren Brutvögel:	EHZ	Anh I / Art 4(2)	Revierzentren Brutvögel:	EHZ	Anh I / Art 4(2)
Be	Bekassine	C Art 4	Nr	Nachtreier (U) (Z)	C Anh I
Bk	Blauehlichen	A Anh I	Nt	Neuntöter	C Anh I
Bk	Braunehlichen	C Art 4	Pr	Pururreiher (U)	C Anh I
Dg	Dorngrasmücke	B Art 4	Row	Rohrweihe	B Anh I
Drs	Drosselrohrsänger	C Art 4	Ros	Rotschenkel	C Art 4
Ev	Eisvogel	C Anh I	Sr	Schilfrohrsänger	C Art 4
Ga	Grauerammer	C Art 4	Sm	Schnatterente	C Anh I
Grr	Graureiher	B Art 4	SKm	Schwarzkopfmöwe	C Anh I
Gbv	Großer Brachvogel	C Art 4	Swm	Schwarzmilan (G)	C Anh I
Ht	Haubentaucher	C Art 4	Ta	Tafelente	C Art 4
Ki	Kiebitz	C Art 4	Us	Uferschnepfe	C Art 4
Kn	Knäkente	B Art 4	W	Wiesenpieper	B Art 4
Kw	Kornweihe (Schilfplatz)	B Anh I	Wt	Wiesenschafstelze	B Art 4
Kr	Krickente	C Art 4	St	Wachtel	B Art 4
Lm	Lachmöwe	C Art 4	Wk	Wachtelkönig	C Anh I
Lö	Löffelente	C Art 4	Wst	Weißstorch	A Anh I

Erhaltungszustand	Brutstatus	Status im Gebiet
A hervorragend	mojl Brutvogel / Brutneststellung	A Ausnahmestage
B gut	Brutnachweis	B Brutvogel (vergleiche Brutstatus)
C mittel bis schlecht	Brutnachweis	G (Nahrungs-) gast
	BP = Brutpaare	N Nahrungsstich
		U Überwinterer
		W Wintergast
		Z Zuggast

Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4(2) der Vogelschutzrichtlinie, die bisher nicht im SDB aufgeführt sind

Revierzentren Brutvögel:	Andere bedeutende Arten der Fauna und Flora gem. SDB, 3.3
Bp	Kormoran (B)
Bern	
Bf	
Fs	
Frp	
Ku	
P	
Rm	
Su	
T	
Ww	
Ww	
Zd	
Zt	

Sonstige charakteristische Brutvögel, die unter 3.3 des SDB ergänzt werden sollten


Gra	Graugans
Ro	Rohrammer
Sm	Schwanzmeise
Tr	Teichhuhn
Wm	Weidenmeise

Weitere Zugvögel mit signifikanten Vorkommen im SPA

D	Döhle (Schilfplatz)
F	Fitis (B)
M	Mittelmeermöwe (B)

Habitats der Vogelarten (SDB)

- SPA-Gebiet (Mertin (W), Schwarzmilan (G), Silberreiher (W) (Z) (U), Singenschwan (Z), Stockente)
- SPA-Gebiet ohne Altmühlsee (Kornweihe (W), Wachtel, Weißstorch, Wiesenschafstelze)
- Gastvogel im SPA-Gebiet an Flachmulden und Hochwasserseigen (Bekassine, Bruchwasserläufer (Z), Grünschenkel (Z), Kampfläufer (Z), Knäkente (Z), Löffelente, Pfeifente, Rotschenkel (Z), Spießente)
- Wiesenbrüter-Habitat, herausragende, bundesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Grauerammer, Großer Brachvogel, Kampfläufer (hier Bruthabitat), Rotschenkel, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Seeadler]
- Wiesenbrüter-Habitat, sehr hochwertig, landesweite Bedeutung [Bekassine, Braunehlichen, Goldenregenpfeifer (Z), Grauerammer, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Sumpfrohrsänger (W) (Z), Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenpieper]; nur im Wiesmet: [Knäkente, Löffelente, Kampfläufer (Z)]
- Wiesenbrüter-Habitat, hochwertig, überregionale Bedeutung [Grauerammer, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtel, Wachtelkönig, Wiesenpieper]
- Wiesenbrüter-Habitat [Kiebitz]
- Röhricht-Habitats auf der Vogelinsel [Blauehlichen, Drosselrohrsänger, Kleines Sumpfhuhn, Pururreiher, Rohrdommel, Rohrweihe, Schilfrohrsänger, Teichrohrsänger, Wasserralle]
- Röhricht, Großseggen oder Hochstauden mit einzelnen Gehölzen im SPA-Gebiet außerhalb der Vogelinsel [Blauehlichen, Dorngrasmücke, Rohrweihe, Schilfrohrsänger]
- Fließgewässerhabitat [Eisvogel]
- Vogelinsel mit Komplex aus Röhrichten, Inseln und Weichholzbeständen [Stelzenläufer (A), Bekassine, Brandgans, Brandseeschwalbe (A), Bruchwasserläufer, Fischadler, Goldenregenpfeifer, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünschenkel, Haubentaucher, Kampfläufer, Knäkente, Kranich (Z), Krickente, Küstenseeschwalbe (A), Lachmöwe, Löffelente, Löffler (Z) (U), Moorente, Nachtreier, Odinshühchen, Pfeifente, Raubseeschwalbe (Z), Rotschenkel, Säbelschnäbler, Schnatterente, Schwarzkopfmöwe, Seidenreiher, Spießente, Sumpfrohrsänger, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
- Gehölz-Ringwall auf der Vogelinsel [Beutelmehse, Fischadler, Nachtreier, Schwarzmilan, Seeadler]
- Seefläche [Brandseeschwalbe (A), Fischadler, Haubentaucher, Küstenseeschwalbe (A), Odinshühchen (A), Ohrentaucher, Prachtaucher, Raubseeschwalbe, Spießente, Trauerseeschwalbe, Uferschwalbe, Weißflügelseeschwalbe, Zwergseeschwalbe (A)]
- Seeadler-Nahrungshabitat mit Ruhezonen
- Halboffenland-Komplex und Gehölze, feuchte Ausbildung [Braunehlichen, Dorngrasmücke, Neuntöter]
- Halbopenland-Komplex und Gehölze [Dorngrasmücke, Neuntöter]
- Waldchen und Feldgehölze [Baumfalke, Seeadler, Schwarzmilan]



Managementplanung
SPA-Gebiet 6728-471
Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee

Karte 2 Bestand und Bewertung der Habitats der Vögel

Blatt: Detailblatt Wiesmet
Kartenfertigung: 27.08.2014

Bearbeitung: Planungsbüro: Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie

Regierung von Mittelfranken

Originalmaßstab: 1:7.500

0 75 150 300 Meter

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten: Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de) Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)